

Datos del Producto

Número de Registro: 18992 **Estado:** Vigente **Fechas** **Inscripción:** 03/04/1992 **Renovación:** 18/01/2017 **Caducidad:** 31/12/2022

Nombre Comercial: KUMULUS DF

Titular

BASF ESPAÑOLA S.L.U.

Can Rabia, 3-5

08017 Barcelona
(Barcelona)

ESPAÑA

Fabricante

BASF SE

Carl-Bosch Str. 38

D-67056 Ludwigshafen
(Rhein)

ALEMANIA

Composición

AZUFRE 80% [WG] P/P

Envases

Bolsas de polietileno (FFS) o bolsa de papel/polietileno de 1, 5, 10, 15, 20, 25 kg y de 30 pounds (13,6 kg).

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Alcachofa	ÁCAROS ARAÑA ROJA	0,2 - 0,5 Kg/Hl	Máx. 3	15	1000 l/ha	Aire libre. Aplicar desde el desarrollo de las hojas hasta la floración. No exceder los 12 Kg/ha de materia activa en un año.
	OIDIO					
Almendro	ÁCAROS ARAÑA ROJA	0,2 - 0,5 Kg/Hl	Máx. 4	7-14	1000-1500 l/ha	Aplicar desde que las primeras hojas alcancen el tamaño varietal final hasta el aumento de la coloración de los frutos.
	OIDIO					
Arbustos y pequeños árboles ornamentales	ARAÑA ROJA	0,2 - 0,5 Kg/Hl	Máx. 4	7-10	1000 l/ha	No exceder 40 Kg/ha de materia activa en un año.
	OIDIO					
Berenjena	ÁCAROS ARAÑA ROJA	0,2 - 0,5 Kg/Hl	Máx. 3	15	1000 l/ha	Aire libre e invernadero. Aplicar desde el desarrollo de las hojas hasta la floración. No exceder los 12 Kg/ha de materia activa en un año.
	OIDIO					

Cereales de invierno / primavera	OIDIO	0,2 - 0,5 Kg/Hl	Máx. 4	7-14	1000 l/ha	Aplicar desde la aparición de la hoja bandera hasta el estadio de grano lechoso. No exceder 16 Kg/ha de materia activa en un año.
Cucurbitáceas	ÁCAROS					
	ARAÑA ROJA					
	OIDIO	0,2 - 0,5 Kg/Hl	Máx. 3	15	1000 l/ha	Aire libre e invernadero. Aplicar desde el desarrollo de las hojas hasta la floración. No exceder los 12 Kg/ha de materia activa en un año.
Fresal	ÁCAROS					
	ARAÑA ROJA					
	OIDIO	0,2 - 0,5 Kg/Hl	Máx. 3	15	1000 l/ha	Aire libre, invernadero y cultivo protegido. Aplicar desde el desarrollo de las hojas hasta la floración. No exceder los 12 Kg/ha de materia activa en un año.
Frutales de hueso	ÁCAROS					
	ARAÑA ROJA					
	OIDIO	0,2 - 0,5 Kg/Hl	Máx. 4	7-14	1000-1500 l/ha	Aplicar desde que las primeras hojas alcancen el tamaño varietal final hasta el aumento de la coloración de los frutos.
Frutales de pepita	ÁCAROS					
	ARAÑA ROJA					
	OIDIO	0,2 - 0,5 Kg/Hl	Máx. 4	7-14	1000-1500 l/ha	Aplicar desde que las primeras hojas alcancen el tamaño varietal final hasta el aumento de la coloración de los frutos.
Guisante para grano	ÁCAROS					
	ARAÑA ROJA					
	OIDIO	0,2 - 0,5 Kg/Hl	Máx. 3	15	1000 l/ha	Aire libre e invernadero. Aplicar desde el desarrollo de las hojas hasta la maduración de los frutos y semillas. No exceder los 12 Kg/ha de materia activa en un año.
Guisante verde	ÁCAROS					
	ARAÑA ROJA					
	OIDIO	0,2 - 0,5 Kg/Hl	Máx. 3	15	1000 l/ha	Aire libre e invernadero. Aplicar desde el desarrollo de las hojas hasta la maduración de los frutos y semillas. No exceder los 12 Kg/ha de materia activa en un año.
Lechuga	ÁCAROS					
	ARAÑA ROJA					
	OIDIO	0,2 - 0,5 Kg/Hl	Máx. 3	15	1000 l/ha	Aire libre. Aplicar desde el desarrollo de las hojas hasta la floración. No exceder los 12 Kg/ha de materia activa en un año.
Lúpulo	ARAÑA ROJA					
	OIDIO	0,2 - 0,5 Kg/Hl	Máx. 4	5-10	200-2500 l/ha	Aplicar desde el despliegue de las hojas hasta el 70% de las cabezuelas cerradas. No exceder 70 Kg/ha de materia activa en un año.
Olivo	NEGRILLA	0,2 - 0,5 Kg/Hl	Máx. 4	7-14	1000 l/ha	Aplicar desde el inicio del desarrollo de las yemas hasta el final de la maduración (entrada en reposo).
Ornamentales herbáceas	ARAÑA ROJA					
	OIDIO	0,2 - 0,5 Kg/Hl	Máx. 4	7-10	1000 l/ha	No exceder 40 Kg/ha de materia activa en un año.
Pimiento	ÁCAROS					
	ARAÑA ROJA					
	OIDIO	0,2 - 0,5 Kg/Hl	Máx. 3	15	1000 l/ha	Aire libre e invernadero. Aplicar desde el desarrollo de las hojas hasta la floración. No exceder los 12 Kg/ha de materia activa en un año.
Plantaciones tropicales y subtropicales	ÁCAROS					
	ARAÑA ROJA					
	OIDIO	0,2 - 0,5 Kg/Hl	Máx. 4	7-14	3000 l/ha	Excepto granado. Aplicar desde que las primeras hojas alcancen el tamaño varietal final hasta el aumento de la coloración de los frutos.. No exceder 36 Kg/ha de materia activa en un año.

Remolacha azucarera	ARAÑA ROJA						
	OIDIO	0,2 - 0,5 Kg/HA	Máx. 4	7-14	1000 l/ha	Aplicar desde el desarrollo de la roseta hasta la cosecha. No exceder 16 Kg/ha de materia activa en un año.	
Tomate	ÁCAROS						
	ARAÑA ROJA						
Vid de mesa	OIDIO	0,2 - 0,5 Kg/HA	Máx. 3	15	1000 l/ha	Aire libre e invernadero. Aplicar desde el desarrollo de las hojas hasta la floración. No exceder los 12 Kg/ha de materia activa en un año.	
	ÁCAROS						
Vid de vinificación	ARAÑA ROJA						
	OIDIO	0,2 - 0,5 Kg/HA	Máx. 4	7-14	1000 l/ha	Aplicar desde la apertura de las yemas hasta el comienzo de la maduración. Los tratamientos deben realizarse asegurando una cobertura total, sobre todo de los racimos.	
Zanahoria	ÁCAROS						
	ARAÑA ROJA						
Zanahoria	OIDIO	0,2 - 0,5 Kg/HA	Máx. 3	15	1000 l/ha	Aire libre e invernadero. Aplicar desde el desarrollo de las hojas hasta la floración. No exceder los 12 Kg/ha de materia activa en un año.	

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)



USO	P.S. (días)
Alcachofa, Almendro, Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Berenjena, Cereales de invierno / primavera, Cucurbitáceas, Fresal, Frutales de hueso, Frutales de pepita, Guisante para grano, Guisante verde, Lechuga, Lúpulo, Olivo, Ornamentales herbáceas, Pimiento, Plantaciones tropicales y subtropicales, Remolacha azucarera, Tomate, Vid de mesa, Vid de vinificación, Zanahoria	NP

Condiciones Generales de Uso



Uso fungicida y acaricida. Aplicar en pulverización normal variando la dosis según la temperatura ambiental, época de tratamiento, cultivo, etc. No efectuar tratamientos a temperaturas demasiado elevadas. No aplicar aceites minerales durante los 21 días anteriores o posteriores a la aplicación del azufre. No mezclar con aceites ni con productos de reacción alcalina. No aplicar en cultivos cuyos frutos sean destinados a conserva. Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales (cultivos agrícolas, plantaciones agrícolas). Producto no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria definidos en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre.

Clase de Usuario



Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

Mitigación de riesgos en la manipulación



SEGURIDAD DEL APLICADOR

AIRE LIBRE:

• MEZCLA, CARGA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO:

Para pulverizaciones con tracto y manuales con lanza/pistola o mochila:

- o Ropa de trabajo
- o guantes de protección química

• APLICACIÓN:

Mediante tractor: ropa de trabajo.

Mediante lanza/pistola y mochila: ropa de trabajo y guantes de protección química.

INVERNADERO:

• MEZCLA, CARGA, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO:

- o Ropa de trabajo
- o guantes de protección química

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

- o Ropa de trabajo

FRASES ASOCIADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO

Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.

Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo

No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

En el cultivo de remolacha, en caso de tener que colocar, retirar o mover los tubos de riego en las 48 horas posteriores al tratamiento fitosanitario, se utilizarán botas (de caucho o poliméricas), ropa y guantes de protección química adecuados.

Clasificaciones y Etiquetado



Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. EUH 210 -Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de Prudencia	P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P280 -Llevar guantes y prendas de protección.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	

Mitigación de riesgos ambientales

Para proteger a los mamíferos rumiantes, no aplicar en suelos cercanos a zonas donde pasten rumiantes.

Spe3: - Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

- Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de: Olivo y ornamentales: 5 m o sin banda con boquillas del 50% de reducción de la deriva. Vid: 10 m o sin banda con boquillas del 75% de reducción de la deriva. Frutales tropicales y lúpulo: 15 m o sin banda con boquillas del 90% de reducción de la deriva. Frutales de hueso y pepita: 20 m o sin banda con boquillas del 90% de reducción de la deriva. hasta la zona no cultivada.



Gestión de Envases

Confirme a lo establecido en el R.D. 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.



Otras Indicaciones reglamentarias

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

