



RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Nombre comercial: PLATINUM FLOW

Número de autorización: ES-00985

Estado: Vigente

Fecha de inscripción: 24/11/2009

Fecha de Caducidad: 31/12/2025

Titular

SPACHEM, S.L.

Polígono Industrial Guadasequies

46839 GUADASEQUIES

(Valencia)

ESPAÑA

Fabricante

SPACHEM, S.L.

Polígono Industrial Guadasequies

46839 GUADASEQUIES

(Valencia)

ESPAÑA

Composición: OXICLORURO DE COBRE 70% [SC] P/V

Envases:

Presentación/Capacidad/Material

Uso no profesional:

- Botellas de HDPE de 250 ml y 500 ml (diámetro cuello: 40 mm) del tipo separate measure (medida separada) y del tipo integral squeeze-to-fill measure (medida en el envase).

Por estar la mezcla clasificada por su toxicidad aguda, los envases deberán ir provistos de una advertencia detectable al tacto que deberá ajustarse a la norma EN ISO 11683 modificada "Envases – Marcas táctiles de peligro – Requisitos".

Deberá cumplirse lo establecido en el artículo 48.2 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Uso profesional:

- Botellas de HDPE de 250 ml y 500 ml (diámetro cuello: 40 mm).
- Garrafa de HDPE de 1 l (diámetro cuello: 40 mm) y 5 l (diámetro cuello: 105 mm).



Usos y dosis autorizados:

USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Pulverización normal con tractor						
Olivo	REPILO	1,5	1-2	23 días	1000 l/ha	Eficaz contra <i>Cyloconium oleaginum</i> . Aplicar en BBCH 00-04, BBCH 11-69 y BBCH 80-85.
	TUBERCULOSIS					Eficaz contra <i>Pseudomonas savastanoi pv savastanoi</i> . Aplicar en BBCH 00-04, BBCH 11-69 y BBCH 80-85.
Tomate	MILDIU	1,05	1-4	7-14 días	700 l/ha	Eficaz contra <i>Phytophthora infestans</i> . Aplicar entre BBCH 15-89.
Vid	MILDIU	1,5	1-3	7-14 días	1000 l/ha	Eficaz contra <i>Plasmopara viticola</i> . Aplicar entre BBCH 15-81.
	BACTERIOSIS					
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Manual con lanza o pistola						
Olivo	REPILO	1,5	1-2	23 días	1000 l/ha	Eficaz contra <i>Cyloconium oleaginum</i> . Aplicar en BBCH 00-04, BBCH 11-69 y BBCH 80-85.
	TUBERCULOSIS					Eficaz contra <i>Pseudomonas savastanoi pv savastanoi</i> . Aplicar en BBCH 00-04, BBCH 11-69 y BBCH 80-85.
Tomate	MILDIU	1,05	1-4	7-14 días	700 l/ha	Eficaz contra <i>Phytophthora infestans</i> . Aplicar entre BBCH 15-89.
Vid	MILDIU	1,5	1-3	7-14 días	1000 l/ha	Eficaz contra <i>Plasmopara viticola</i> . Aplicar entre BBCH 15-81.
	BACTERIOSIS					
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Manual con lanza o pistola						



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Tomate	MILDIU	1,05	1-4	7-14 días	700 l/ha	Eficaz contra Phytophthora infestans. Aplicar entre BBCH 15 hasta desarrollo vegetativo inferior a 1 m.
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Manual con mochila						
Olivo	REPILO	1,5	1-2	23 días	1000 l/ha	Eficaz contra Cycloconium oleaginum. Aplicar en BBCH 00-04, BBCH 11-69 y BBCH 80-85.
	TUBERCULOSIS					Eficaz contra Pseudomonas savastanoi pv savastanoi. Aplicar en BBCH 00-04, BBCH 11-69 y BBCH 80-85.
Tomate	MILDIU	1,05	1-4	7-14 días	700 l/ha	Eficaz contra Phytophthora infestans. Aplicar entre BBCH 15-89.
Vid	MILDIU	1,5	1-3	7-14 días	1000 l/ha	Eficaz contra Plasmopara viticola. Aplicar entre BBCH 15-81.
	BACTERIOSIS					
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Manual con mochila						
Tomate	MILDIU	1,05	1-4	7-14 días	700 l/ha	Eficaz contra Phytophthora infestans. Aplicar entre BBCH 15 hasta desarrollo vegetativo inferior a 1 m.
Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Otros (ver condic.)						
Olivo	REPILO	1,5	1-2	23 días	1000 l/ha	Eficaz contra Cycloconium oleaginum. Aplicar con mochila pulverizadora de 5 l. Aplicar en BBCH 00-04, BBCH 11-69 y BBCH 80-85.
	TUBERCULOSIS					Eficaz contra Pseudomonas savastanoi vs savastanoi. Aplicar con mochila pulverizadora de 5 l. Aplicar en BBCH 00-04, BBCH 11-69 y BBCH 80-85.



Nº REGISTRO: ES-00985

PLATINUM FLOW

USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Tomate	MILDIU	1,05	1-2	7-14 días	700 l/ha	Eficaz contra Phytophthora infestans. Aplicar con mochila pulverizadora de 5 l. Aplicar entre BBCH 15-89.
Vid	MILDIU	1,5	1-2	7-14 días	1000 l/ha	Eficaz contra Plasmopara viticola. Aplicar con mochila pulverizadora de 5 l. Aplicar entre BBCH 15-81.
	BACTERIOSIS					Aplicar con mochila pulverizadora de 5 l. Aplicar entre BBCH 15-81.

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):

Uso	P.S. (días)
Olivo	14
Vid	21
Tomate	3 (FRESCO) 10 (INDUSTRIA)

Condiciones generales de uso:

Fungicida-bactericida de contacto autorizado para uso profesional y no profesional en usos al aire libre e invernadero.

No superar la dosis máxima de 4 kg/ha y año de Cu (Cu inorgánico).

En la etiqueta se darán las instrucciones oportunas para el correcto uso del producto.

Excepciones: --

Clase de usuario:

Uso profesional y no profesional.

Uso	Profesional / No Profesional	Agrario / No Agrario
Olivo, Tomate, Vid	Profesional	Agrario
Olivo, Tomate, Vid	No Profesional	No Agrario

Mitigación de riesgos en la manipulación:



USO PROFESIONAL (aire libre e invernadero):

Seguridad del APLICADOR:

Durante la mezcla/carga se deberán utilizar guantes de protección química, ropa de protección tipo 6 o C1, calzado de protección frente a productos químicos, ropa de protección parcial tipo delantal tipo PB 3 o PB 4 o parcial de nivel C3.

Durante la aplicación se deberán utilizar guantes de protección química, ropa de protección tipo 6 o C1 y calzado de protección frente a productos químicos.

Seguridad del TRABAJADOR:

Durante la reentrada se deberá utilizar ropa de trabajo o C1.

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga.
- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.

USO NO PROFESIONAL (solo al aire libre).

No se requieren equipos de protección específicos.

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- Se recomienda el uso de guantes de protección química durante el manejo del producto, así como ropa de manga larga, pantalón largo y calzado cerrado.

NORMATIVA APLICABLE:

- Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN ISO-374-1:2016/A1:2018. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables y deben tener la resistencia mecánica que requiera la actividad a realizar. En caso de rotura, deberán ser reemplazados inmediatamente.
- Ropa de protección tipo 6: frente a salpicaduras de productos líquidos, conforme a norma UNE-EN13034: 2005 + A1: 2009.
- Ropa de protección C1, C3, tanto de protección completa como parcial, frente a productos fitosanitarios según norma UNE –EN –ISO 27065:2017/A1:2019.
- Ropa de protección parcial tipo PB3 o PB4: Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]) según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009.
- Calzado de protección frente a productos químicos, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II) conforme a la norma UNE-EN 13832-2:2020.
- Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2).

Clasificaciones y Etiquetado:

Clase y categoría de peligro (Humana)	Toxicidad aguda (oral e inhalatoria). Categoría 4.
--	--



Pictograma	GHS07 (signo de exclamación)
Palabra Advertencia	Atención
Indicaciones de peligro	H302+H332 - Nocivo en caso de ingestión o inhalación.
Consejos de Prudencia	P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. (Únicamente para los envases destinados a jardinería exterior doméstica). P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)	Acuático agudo 1 Acuático crónico 1
Pictograma	GHS09 (medio ambiente)
Palabra Advertencia	Atención
Indicaciones de peligro	H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos Prudencia	P273 - Evitar su liberación al medio ambiente. P391 - Recoger el vertido. P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.

Mitigación de riesgos ambientales:

Spe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 10 con cubierta vegetal para vid y tomate al aire libre y de 20 m con cubierta vegetal para olivo hasta las masas de agua superficial.

Spe8: Peligroso para las abejas. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos. No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo. Retírense o cúbranse las colmenas durante el tratamiento y 5 días después del mismo. No aplicar cuando las malas hierbas estén en floración.

SPe1: Para proteger los organismos del suelo, no aplicar este ni ningún otro producto que contenga cobre a una dosis anual superior a 4 kg Cu/ha por año.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Eliminación Producto y/o caldo:



SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Gestión de envases:

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras indicaciones reglamentarias:

Autorizado para uso no profesional.

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

En la etiqueta de este producto se deberá incluir la leyenda "autorizado para uso no profesional", en caracteres preferiblemente visibles.

Para el uso no profesional y en aquellas zonas destinadas al uso público en general, se deberá cumplir con las especificaciones recogidas en el Real Decreto 1311/2012 por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Observaciones:

En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/909/2017, de 25 de septiembre, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados.

Condiciones de almacenamiento: --